



Milchzähne




Abgebrochen

Bei kleineren abgebrochenen Stücken innert Tagen zum Zahnarzt.
Bei Blutung aus dem Zahn am selben Tag zum Zahnarzt.




Gelockert

Behandlung ist nicht dringend.
Zahnarzt innert Tagen konsultieren.




Verschoben

Möglichst sofort zum Zahnarzt,
damit der Zahn allenfalls an seinen
richtigen Platz gedrückt werden kann
(nur **am selben Tag** möglich!).



Hineingeschlagen

Behandlung ist nicht dringend,
da es meist nicht sinnvoll ist,
ausgeschlagene Milchzähne wieder
einzusetzen (innert Tagen zum
Zahnarzt).



Herausgeschlagen

Behandlung ist selten nötig. Auf jeden
Fall aber Zahnarzt informieren
(Höchstes **Folgeschäden-Risiko** für
bleibenden Zahn!).

Milchzahnunfälle können Schäden
an noch nicht durchgebrochenen
bleibenden Zähnen verursachen! Diese
Zahnkeime sind unter bzw. hinter den
Milchzähnen angeordnet, und befinden
sich in einem verletzbaren Entwick-
lungsstadium. Einwirkungen können den
weiteren normalen Wachstumsverlauf
stören und verschiedene Defekte am
bleibenden Zahn hinterlassen.